

# Äquivalenzrelationen und große Kardinalzahlen

Ralf Schindler

Universität Münster  
Institut für Mathematische Logik und  
Grundlagenforschung

## Definierbare Äquivalenzrelationen

Wir betrachten Äquivalenzrelationen auf der Menge  $\mathbb{R}$  der reellen Zahlen.

$E \subset \mathbb{R}^2$  ist eine Äquivalenzrelation gdw. für alle reellen Zahlen  $x, y, z$  gilt:

- $xEx$
- $xEy \Rightarrow yEx$  und
- $xEy \wedge yEz \Rightarrow xEz$ .

Wie kompliziert können derartige Äquivalenzrelationen sein? Z.B.: wie viele Äquivalenzklassen  $[x]_E = \{y | yEx\}$  kann es geben?

Jede Äquivalenzrelation auf  $\mathbb{R}$  besitzt mindestens eine und höchstens  $2^{\aleph_0}$  (d.h. reell viele) Äquivalenzklassen.

Mit Hilfe des Auswahlaxioms konstruiert man sehr leicht für jedes  $\kappa$  mit  $1 \leq \kappa \leq 2^{\aleph_0}$  eine Äquivalenzrelation mit genau  $\kappa$  Äquivalenzklassen: Wähle  $f: \kappa \rightarrow \mathbb{R}$  injektiv; setze  $xEy$  gdw.  $x = y$  oder  $x, y \notin \text{ran}(f \upharpoonright \{\alpha \mid \alpha > 0\})$ .

Wir betrachten daher *definierbare* Äquivalenzrelationen.

Ein berühmtes Beispiel:

Die *Vitali-Äquivalenzrelation*:  $x E_0 y \Leftrightarrow y - x \in \mathbb{Q}$ .

**Theorem (Pythagoräer, 500 v.u.Z.?).**  $E_0$  besitzt mindestens zwei verschiedene Äquivalenzklassen.

$E_0$  besitzt in der Tat  $2^{\aleph_0}$  Äquivalenzklassen.

Ähnliches gilt, wie wir gleich sehen werden, für viele definierbare Äquivalenzrelationen.

Georg Cantor hatte eine ähnliche Frage in Bezug auf bloße *Mengen* reeller Zahlen gestellt:

Wie groß können definierbare Mengen reeller Zahlen sein?

Die Antworten, die es auf Cantors Frage gibt, können mit Hilfe der **klassischen Deskriptiven Mengenlehre** gewonnen werden.

*Klassische Deskriptive Mengenlehre:*

Determiniertheit + große Kardinalzahlen.

Für die Frage nach der möglichen Zahl von Äquivalenzklassen definierbarer Äquivalenzrelationen ist die klassische Deskriptive Mengenlehre nicht ausreichend. Wir benötigen hier die **moderne Deskriptive Mengenlehre**, die die Methoden der Inneren Modelltheorie zu Hilfe nimmt.

*Moderne Deskriptive Mengenlehre:*

Determiniertheit + große Kardinalzahlen +  
Theorie der Inneren Modelle.

Die *Deskriptive Mengenlehre* studiert Eigenschaften *definierbarer* Teilmengen des  $\mathbb{R}^n$ , wobei “definierbar” bedeutet:

- Borel
- analytisch/koanalytisch
- projektiv
- Souslin/universell Bairesch

Äquivalenzrelationen können als Teilmengen des  $\mathbb{R}^2$  in diesem Sinne definierbar sein.

Die Äquivalenzrelation  $E$  heißt *Borel* gdw.  $E$  als Teilmenge des  $\mathbb{R}^2$  eine Borelmenge ist.

Empirische Beobachtung: Jede Borel-Äquivalenzrelation besitzt entweder höchstens abzählbar viele oder  $2^{\aleph_0}$  Äquivalenzklassen.

Beispiele:

**Theorem (Feldman-Moore).** Sei  $E$  eine Borel-Äquivalenzrelation, für die jedes  $[x]_E$  höchstens abzählbar ist. Dann existiert eine abzählbare Polnische Gruppe  $G$ , die auf  $\mathbb{R}$  agiert, so daß  $E$  die durch  $G$  auf  $\mathbb{R}$  induzierte Orbit-Äquivalenzrelation ist.

Eine fundamentale Einsicht ist nun das nachfolgende allgemeine Dichotomie-Resultat:

**Theorem (Silver; 1980).** Sei  $E$  eine Borel-Äquivalenzrelation. Dann gilt entweder:

- $E$  hat höchstens abzählbar viele Äquivalenzklassen, oder
- es gibt eine perfekte Menge  $P \subset \mathbb{R}$  mit  $[x]_E \neq [y]_E$  für alle  $x, y \in P, x \neq y$ .

$P \subset \mathbb{R}$  heißt *perfekt* gdw.

$P \neq \emptyset$ ,

$P$  ist abgeschlossen, und

$P$  besitzt keine isolierten Punkte.

Jede perfekte Menge reeller Zahlen ist gleichmächtig mit  $\mathbb{R}$ .

**Theorem (Hausdorff und Aleksandrov; 1914).**

Jede überabzählbare Borel-Menge enthält eine perfekte Teilmenge.

Nach obigem Satz von Silver gilt also: Sei  $E$  eine Borel-Äquivalenzrelation. Dann besitzt  $E$  entweder höchstens abzählbar viele oder  $2^{\aleph_0}$  Äquivalenzklassen.

$E$  ist also entweder “sehr einfach” oder “sehr kompliziert”.

Nach dem Satz von Hausdorff und Aleksandrov gilt: Sei  $A \subset \mathbb{R}$  Borel. Dann ist  $A$  entweder höchstens abzählbar oder besitzt  $2^{\aleph_0}$  Elemente.

$A \subset \mathbb{R}^k$  heißt *analytisch* (oder  $\Sigma_{\sim 1}^1$ ) gdw.  $A$  Projektion einer Borelmenge  $B \subset \mathbb{R}^{k+1}$  ist, d.h. wenn

$$\vec{x} \in A \Leftrightarrow \exists y(\vec{x}, y) \in B.$$

$A$  ist analytisch gdw.  $A = f(D)$  für eine Borelmenge  $D$  und eine stetige Funktion  $f$  ist.

$A \subset \mathbb{R}^k$  heißt *koanalytisch* (oder  $\Pi_{\sim 1}^1$ ) gdw. das Komplement von  $A$  eine analytische Menge ist.

Borel =  $\Sigma_{\sim 1}^1 \cap \Pi_{\sim 1}^1$ , wobei Borel  $\subsetneq \Sigma_{\sim 1}^1, \Pi_{\sim 1}^1$ .

**Theorem (Silver; 1980).** Sei  $E \subset \mathbb{R}^2$  eine koanalytische Äquivalenzrelation. Dann gilt entweder:

- $E$  hat höchstens abzählbar viele Äquivalenzklassen, oder
- es gibt eine perfekte Menge von paarweise  $E$ -inäquivalenten reellen Zahlen.

**Theorem (Souslin; 1917).** Sei  $A \subset \mathbb{R}$  analytisch. Dann ist  $A$  entweder höchstens abzählbar oder enthält eine perfekte Teilmenge.

Wir werden später sehen, WARUM diese Aussagen richtig sind.

Wie steht es mit analytischen Äquivalenzrelationen bzw. mit koanalytischen Mengen?

Sei  $xEy$  gdw. entweder: weder  $x$  noch  $y$  kodiert eine (abzählbare) Wohlordnung, oder: es existiert ein Isomorphismus zwischen den Ordnungen, die durch  $x$  und  $y$  kodiert werden.

- $E$  ist analytisch, und
- $E$  hat  $\aleph_1$  Äquivalenzklassen.
- Jedes perfekte  $P \subset \mathbb{R}$  enthält zwei  $E$ -äquivalente reelle Zahlen.

**Theorem (Burgess; 1978).** Sei  $E \subset \mathbb{R}^2$  eine analytische Äquivalenzrelation Dann gilt:

- $E$  hat höchstens  $\aleph_1$  Äquivalenzklassen, oder
- es gibt eine perfekte Menge von paarweise  $E$ -inäquivalenten Zahlen.

Komplementär dazu:

**Theorem (Sierpinski; 1925).** Jede koanalytische Menge reeller Zahlen mit mehr als  $\aleph_1$  Elementen besitzt eine perfekte Teilmenge.

Wir wollen endlich  $E$  *dünn* nennen gdw. es kein perfektes  $P \subset \mathbb{R}$  gibt, so daß  $[x]_E \neq [y]_E$  für alle  $x, y \in P, x \neq y$ .

Die Verallgemeinerung des Theorems von Burgess lautet:

**Theorem (Harrington, Shelah; 1980).** ( $V \prec_{\Sigma^1_3} V^{\mathbb{P}}$  für  $\mathbb{P} =$  Cohen forcing.) Sei  $E \subset \mathbb{R}^2$  eine dünne  $\Pi^1_2$  Äquivalenzrelation. Dann hat  $E$  höchstens  $\aleph_1$  Äquivalenzklassen.

Was ist das Muster?

## Projektive Mengen

$A \subset \mathbb{R}^k$  heißt  $\Sigma_{\sim_{n+1}}^1$  gdw.  $A$  Projektion einer  $\Pi_{\sim_n}^1$  Menge  $B \subset \mathbb{R}^{k+1}$  ist.

$A \subset \mathbb{R}^k$  heißt  $\Pi_{\sim_{n+1}}^1$  gdw. das Komplement von  $A$   $\Sigma_{\sim_{n+1}}^1$  ist.

$A \subset \mathbb{R}^k$  heißt  $\Delta_{\sim_n}^1$  gdw.  $A$  sowohl  $\Sigma_{\sim_n}^1$  als auch  $\Pi_{\sim_n}^1$  ist.

$$\dots \Delta_{\sim_n \neq \sim_n}^1 \subset \Sigma_{\sim_n}^1, \Pi_{\sim_n \neq \sim_{n+1}}^1 \subset \Delta_{\sim_n}^1 \dots$$

$$\text{Projektiv} = \bigcup_n \Sigma_{\sim_n}^1 = \bigcup_n \Pi_{\sim_n}^1.$$

Unsere Frage ist jetzt also:

Sei  $E$  eine dünne projektive Äquivalenzrelation.  
Wieviele Äquivalenzklassen kann  $E$  haben?

(Man kann zeigen, daß es projektive Äquivalenzrelationen mit  $\aleph_2$  und mehr Äquivalenzklassen geben kann, siehe unten!)

Die Variante dieser Frage für Mengen reeller Zahlen lautet: gibt es definierbare Gegenbeispiele zur **Kontinuumshypothese**?

Wir müssen, wie wir sehen werden, starke Axiome heranziehen, um diese Fragen anzugehen!

## $\kappa$ Souslinsche Mengen

Eine Menge  $A \subset \mathbb{R}$  heißt  $\kappa$  Souslin gdw. es einen Baum auf  $\mathbb{N} \times \kappa$  gibt, so daß  $A = p[T]$ , d.h.

$$x \in A \Leftrightarrow \exists f \in {}^{\mathbb{N}}\kappa \forall n (x \upharpoonright n, f \upharpoonright n) \in T.$$

$A \subset \mathbb{R}$  ist  $\aleph_0$  Souslin gdw.  $A$  analytisch ist.

Jede koanalytische, sogar jede  $\Sigma_2^1$  Menge  $A \subset \mathbb{R}$  ist  $\aleph_1$  Souslin.

(Jedes  $A \subset \mathbb{R}$  ist trivial  $2^{\aleph_0}$  Souslin.)

Die folgende Aussage erklärt die Resultate, die wir bislang gesehen haben.

Eine Äquivalenzrelation  $E \subset \mathbb{R}^2$  heißt  $ko$ - $\kappa$  Souslin gdw.  $\mathbb{R}^2 \setminus E$   $\kappa$  Souslin ist.

**Theorem (Harrington, Shelah; 1980).** Sei  $E \subset \mathbb{R}^2$  eine dünne  $ko$ - $\kappa$  Souslin Äquivalenzrelation. Sei zusätzlich  $E$  immer noch eine Äquivalenzrelation in  $V^{\mathbb{P}}$ , wobei  $\mathbb{P} = \text{Cohen forcing}$ . Dann hat  $E$  höchstens  $\kappa$  Äquivalenzklassen.

Komplementär dazu:

**Theorem (Mansfield; 1970).** Sei  $A \subset \mathbb{R}$   $\kappa$  Souslin. Wenn  $A$  mehr als  $\kappa$  Elemente besitzt, dann hat  $A$  eine perfekte Teilmenge.

Um die optimalen Resultate zu erzielen, müssen wir zu gegebener definierbarer Äquivalenzrelation  $E$  das kleinste  $\kappa$  bestimmen, so daß  $E$   $\kappa$  Souslin ist.

Wir benötigen hierfür die moderne Deskriptive Mengenlehre.

## ZFC

ZFC (Zermelo-Fraenkel mit Auswahl) ist die Standardaxiomatisierung der Mengenlehre.

Axiome von Z: Extensionalität, Fundierung, Paarmenge, Vereinigungsmenge, Potenzmenge, Unendlichkeit, Aussonderung.

Axiome von ZF: Z + Ersetzung.

Axiome von ZFC: ZF + Auswahlaxiom.

## Projektive Determiniertheit

Sei  $A \subset [0, 1]$ .

Gale/Stewart (1953): Betrachte das folgende Spiel,  $G(A)$ :

$$\begin{array}{c|cccc} I & i_0 & & i_2 & \dots \\ \hline II & & i_1 & & i_3 & \dots \end{array}$$

$i_n \in \{0, 1\}$ . D.h.  $\sum_{n < \infty} \frac{i_n}{2^{n+1}} \in [0, 1]$ .

$I$  gewinnt. gdw.  $\sum_{n < \infty} \frac{i_n}{2^{n+1}} \in A$ , ansonsten gewinnt  $II$ .

$G(A)$  (oder auch  $A$  selbst) heißt *determiniert* gdw. entweder  $I$  oder  $II$  eine Gewinnstrategie hat.

**Theorem (Martin; 1970).** Jede Borel-Menge ist determiniert.

Sei  $\Gamma$  eine hinreichend abgeschlossene Klasse von Mengen reeller Zahlen. Wenn dann  $A$  determiniert ist für jedes  $A \in \Gamma$ , dann gilt:

**Theorem (Mycielski-Swierczkowski; 1964).** Wenn  $A \in \Gamma$ , dann ist  $A$  Lebesgue-meßbar.

**Theorem (Mazur; 193?).** Wenn  $A \in \Gamma$ , dann hat  $A$  die Bairesche Eigenschaft.

**Theorem (Davis; 1964).** Wenn  $A \in \Gamma$  überabzählbar ist, dann hat  $A$  eine perfekte Teilmenge.

Die Determiniertheit der Menge  $A \subset \mathbb{R}^2$  liefert den tieferen Grund dafür, warum  $\exists^{\mathbb{R}} A$  entweder höchstens abzählbar ist oder eine perfekte Teilmenge enthält.

**Projektive Determiniertheit (PD)** ist die Aussage, daß jede projektive Menge reeller Zahlen determiniert ist.

Aufgrund des Satzes von Davis gibt es also (unter PD) keine projektiven  $A \subset \mathbb{R}$ , deren Mächtigkeit zwischen der von  $\mathbb{N}$  und der von  $\mathbb{R}$  liegt. Es gibt also keine projektiven Gegenbeispiele zur Kontinuumshypothese.

Für Äquivalenzrelationen gilt analoges *nicht* !

D.h., auch unter PD kann es projektive Äquivalenzrelationen  $E$  geben, so daß  $\mathbb{R}/E$  von einer Mächtigkeit *zwischen*  $\aleph_1$  und  $\aleph_2$  ist.

Nicht zuletzt darum sind Äquivalenzrelationen interessanter als bloße Mengen reeller Zahlen.

Tatsache ist nun, daß Projektive Determiniertheit die Konsistenz sehr großer Kardinalzahlen impliziert. Umgekehrt beweisen große Kardinalzahlen PD.

## Große Kardinalzahlen

Eine Kardinalzahl  $\kappa$  heißt *groß*, wenn die Existenz von  $\kappa$  nicht in ZFC bewiesen werden kann.

Beispiele:

Unerreichbar  $<$  Mahlo  $<$  schwach kompakt  $<$  unbeschreibbar  $<$   $0^\#$   $<$  meßbar  $<$  meßbar mit hoher Mitchell-Ordnung  $<$  stark  $<$  Woodin  $<$  nicht zahm  $<$  nicht domestiziert  $<$  Shelah  $<$  superkompakt  $<$  riesig

**Theorem (Martin-Steel; 1985).** Die Existenz unendlich vieler Woodin-Kardinalzahlen impliziert PD.

$$\Theta \text{ und } \delta_{\sim_n}^1$$

Man definiert

$$\Theta = \sup\{\alpha \mid \exists f: \mathbb{R} \xrightarrow{\text{surj.}} \alpha\}.$$

Es ist leicht zu sehen, daß  $\Theta = (2^{\aleph_0})^+$ .

Interessanter sind "lokale Versionen" von  $\Theta$ :

Für  $n \in \mathbb{N}$  sei

$$\delta_{\sim_n}^1 = \sup\{\alpha \mid \exists f: \mathbb{R} \xrightarrow{\text{surj.}} \alpha, f \in \Delta_{\sim_n}^1\}.$$

(Hierbei bedeutet  $f \in \Delta_{\sim_n}^1$ , daß der Graph von  $f$  eine  $\Delta_{\sim_n}^1$  Menge im  $\mathbb{R}^2$  ist.)

Es gilt

$$\aleph_1 = \delta_{\sim_1}^1 < \delta_{\sim_2}^1 < \delta_{\sim_3}^1 < \dots < \Theta.$$

Keine der Zahlen  $\delta_{\sim n}^1$  für  $n > 1$  muß eine Kardinalzahl sein.

Aus der Kontinuumhypothese folgt

$$\aleph_1 = \delta_{\sim 1}^1 < \delta_{\sim 2}^1 < \delta_{\sim 3}^1 < \dots \Theta = \aleph_2.$$

Auf der anderen Seite hat Woodin 1990 bewiesen, daß  $\delta_{\sim 2}^1 = \aleph_2$  aus natürlichen Axiomen folgt.

$\delta_{\sim n}^1 \geq \aleph_2$  für ein  $n > 1$  liefert ein definierbares Gegenbeispiel zur Kontinuumshypothese *in einem anderen als dem Cantorschen Sinne!*

**Theorem (Kechris, Moschovakis; 1970).** Es gelte Projektive Determiniertheit.

Sei  $A \subset \mathbb{R}^k$  eine  $\Sigma_{\sim n}^1$  Menge. Dann gilt:

- Für ungerades  $n$  ist  $A$   $\kappa$  Souslin für ein  $\kappa < \delta_{\sim n}^1$ ,  
und
- für gerades  $n$  ist  $A$   $\delta_{\sim n-1}^1$  Souslin.

Derartige “Periodizitäten” sind überall in der Deskriptiven Mengenlehre anzutreffen.

**Korollar.** Es gelte Projektive Determiniertheit.  
 Sei  $E \subset \mathbb{R}^2$  eine dünne  $\Pi_{\sim_n}^1$  Äquivalenzrelation.  
 Für ungerades  $n$  hat dann  $E$  weniger als  $\delta_{\sim_n}^1$   
 Äquivalenzklassen. (I.e.  $\text{Card}(\mathbb{R}/E) < \delta_{\sim_n}^1$ .)  
 Für gerades  $n$  hat dann  $E$  höchstens  $\delta_{\sim_{n-1}}^1$  Äqui-  
 valenzklassen. (I.e.,  $\text{Card}(\mathbb{R}/E) \leq \delta_{\sim_{n-1}}^1$ .)

Dieses Korollar, das mit Mitteln der klassischen Deskriptiven Mengenlehre gezeigt wird, erklärt lediglich fast alle Tatsachen bzgl. projektiver Äquivalenzrelationen, nicht aber die folgende.

**Theorem (Kechris; 1978).** Es gelte Projektive Determiniertheit.

Sei  $E \subset \mathbb{R}^2$  eine dünne  $\Sigma_2^1$  Äquivalenzrelation. Dann hat  $E$  höchstens  $\aleph_1$  Äquivalenzklassen.

Greg Hjorth zeigte dies 1997 mit Hilfe iterierbarer Innerer Modelle mit Woodin-Kardinalzahlen. Dieser Ansatz führt zu optimalen Resultaten bzgl. dünner  $\Sigma_n^1$  Äquivalenzrelationen für gerades  $n$ .

Der Satz von Kechris findet dann die folgende Verallgemeinerung.

**Theorem (Sch; 2005).** Sei  $E \subset \mathbb{R}^2$  eine dünne  $\Sigma_{\sim_n}^1$  Äquivalenzrelation, wobei  $n$  gerade ist. Dann ist  $E$  auch  $\Pi_{\sim_n}^1$ . Insbesondere hat  $E$  höchstens  $\delta_{\sim_{n-1}}^1$  Äquivalenzklassen.

Das Muster ist also wie folgt.

Komplexität der dünnen Äquivalenzrelation  $E$

$$\begin{array}{cccc}
 \Pi_{\sim_{2n+1}}^1 & \Sigma_{\sim_{2n+1}}^1 & \Pi_{\sim_{2n+2}}^1 & \Sigma_{\sim_{2n+2}}^1 \\
 \hline
 < \delta_{\sim_{2n+1}}^1 & \leq \delta_{\sim_{2n+1}}^1 & \leq \delta_{\sim_{2n+1}}^1 & \leq \delta_{\sim_{2n+1}}^1
 \end{array}$$

Kardinalität von  $\mathbb{R}/E$

Diese Resultate sind optimal.

Sei  $\varphi: U \rightarrow \delta_{\sim 2n+1}^1$  eine  $\Pi_{\sim 2n+1}^1$  Norm mit assoziiertem PWO  $\leq$ . Sei  $x \leq^* y$  gdw.  $y \notin U$  oder  $(x \in U \wedge x \leq y)$ . Dann ist  $\leq^* \Sigma_{\sim 2n+1}^1$ .

Sei  $xEy$  gdw.  $x \leq^* y \wedge y \leq^* x$ .  $E$  ist dann eine (dünne!)  $\Sigma_{\sim 2n+1}^1$  Äquivalenzrelation mit genau  $\delta_{\sim 2n+1}^1$  Äquivalenzklassen.

Wir wollen nun einen Blick auf den Beweis des letzten Theorems werfen.

## Innere Modelle

$$L_0[X] = \emptyset$$

$L_{\alpha+1}[X]$  = die Menge aller über  $L_\alpha[X]$  mit Hilfe von Parametern aus  $L_\alpha[X]$  definierbaren Teilmengen von  $L_\alpha[X]$ , wobei  $X$  als Prädikat zur Verfügung steht

$$L_\lambda[X] = \bigcup_{\alpha < \lambda} L_\alpha[X] \text{ für Limeszahlen } \lambda$$

$$L[X] = \bigcup_{\alpha} L_\alpha[X]$$

$L = L[\emptyset]$  ist Gödels “konstruktibles Universum”.

**Theorem (Gödel; 1938).**  $L$  ist Modell von ZFC und erfüllt die (Allgemeine) Kontinuums-hypothese.

Dies liefert das Beispiel einer dünnen  $\Delta_{\sim_3}^1$  Äquivalenzrelation, die unter Umständen  $\aleph_2$  Äquivalenzklassen hat:

Setze  $xEy$  gdw.  $(\omega_1^V)^{+L[x]} = (\omega_1^V)^{L[y]}$ .

Es gilt, daß  $E$   $u_2 = \delta_{\sim_2}^1$  Äquivalenzklassen hat;  $u_2 = \aleph_2$  ist nach Woodins Resultat (siehe oben) plausibel.

Die moderne Deskriptive Mengenlehre benötigt *iterierbare Innere Modelle* mit Woodin-Kardinalzahlen.

Diese sind von der Form  $L[E]$ , wobei  $E$  eine Folge von *Externdern* (partiellen "Maßen") kodiert.

Bereits die Konstruktion dieser Modelle ist sehr schwierig.

$M_n$  = das minimale iterierbare Innere Modell mit  $n$  Woodin-Zahlen.

$M_0 = L$ .

## Der Beweis

Sei  $E$  eine dünne  $\Sigma_n^1$  Äquivalenzrelation, wobei  $n$  gerade ist.

Startpunkt:  $\mathcal{M} = M_{n-1}$ , das kleinste iterierbare innere Modell mit  $n-1$  Woodin-Kardinalzahlen. Sei  $\delta$  die kleinste Woodin-Kardinalzahl von  $\mathcal{M}$ . Sei  $\eta < \delta$  eine unerreichbare "lokale Woodin-Kardinalzahl" in  $\mathcal{M}$ .

Sei  $x \in \mathbb{R}$ . Wir können  $x$  generisch am Bild von  $\eta$  über einem Iterat von  $\mathcal{M}||\alpha$  machen (wobei  $\alpha$  maximal ist mit  $\mathcal{M}||\alpha \models \eta$  ist Woodin). Der springende Punkt ist: wenn  $x'$  eine beliebige andere reelle Zahl ist, die ebenfalls generisch am Bild von  $\eta$  über diesem Iterat ist (und einer gewissen Bedingung unterliegt), dann ist  $x'Ex$ . (Wir benutzen hier die Korrektheit von  $\mathcal{M}$  und die Tatsache, daß  $E$  dünn ist.)

Wir können dann  $\neg(xEy)$  wie folgt formulieren.

Es gibt  $x'Ex$  und  $y'Ey$  und es gibt ein Iterat  $\mathcal{M}^*$  von  $\mathcal{M}$  vermöge einer Iteration von  $\mathcal{M}||\alpha$ , die auf  $\mathcal{M}||\eta$  lebt, so daß  $x' \oplus y'$  generisch über  $\mathcal{M}$  am Bild von  $\eta$  ist und  $\mathcal{M}^*[x, y] \models \neg(x'Ey')$ .

Aufgrund der Korrektheit von  $\mathcal{M}$  und aufgrund der Tatsache, daß der relevante Teil der Iterationsstrategie von  $\mathcal{M}$  eine  $\Pi_{n-1}^1$  Menge ist, wird dann  $\neg E$  eine  $\Sigma_n^1(m)$  Menge, wobei  $m$  das Modell  $\mathcal{M}$  kodiert.

Resumee:

Wir haben die möglichen Größen von  $\mathbb{R}/E$  für projektive  $E$  mittels der Zahlen  $\delta_{\sim n}^1$  charakterisiert.

In ZFC läßt sich aber lediglich

$$\aleph_1 = \delta_{\sim 1}^1 < \delta_{\sim 2}^1 < \delta_{\sim 3}^1 < \dots < 2^{\aleph_0}$$

beweisen.

$\delta_{\sim 2}^1 = \aleph_2$  ist möglich.

Die Frage, ob  $\delta_n^1 \geq \aleph_3$  für ein  $n \geq 3$  möglich ist, ist eine der zentralen Fragen der gegenwärtigen Mengenlehre.

Testproblem:

Existiert eine dünne projektive Äquivalenzrelation  $E$  auf  $\mathbb{R}$ , so daß (beweisbar unter vernünftigen Annahmen)  $E$  genau  $\aleph_3$  Äquivalenzklassen hat?