

Übungen zur Vorlesung Mathematik für Physiker I

Abgabe: Donnerstag, 12.12.2019 bis 10h00 in den Briefkästen

Blatt 9

Aufgabe 1. Es sei X eine nichtleere Menge und

$$d(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{falls } x = y \\ 1 & \text{falls } x \neq y \end{cases} \quad \text{für } x, y \in X.$$

- (a) Zeigen Sie: d definiert einen Abstand auf X .
- (b) Beschreiben Sie die offenen Kugeln $K_\epsilon(x)$ in (X, d) . Welche Teilmengen von (X, d) sind offen, welche abgeschlossen?
- (c) Wann konvergiert eine Folge in (X, d) ?

Aufgabe 2. (a) Es sei (X, d) ein metrischer Raum und $x, y \in X$. Zeigen Sie:

$$d'(x, y) = 1 - \frac{1}{1 + d(x, y)}$$

definiert einen weiteren Abstand auf X .

Hinweis: Zeigen Sie zunächst, daß für $a, b \geq 0$ gilt $\frac{1}{1+a} + \frac{1}{1+b} - \frac{1}{1+a+b} \leq 1$.

- (b) Geben Sie eine Familie $(J_n)_{n \in \mathbb{N}}$ offener Intervalle $J_n \subseteq \mathbb{R}$ an, so daß $\bigcap_{i=0}^{\infty} J_n = [0, 1]$ abgeschlossen ist.
Geben Sie eine Familie $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ abgeschlossener Intervalle $I_n \subseteq \mathbb{R}$ an, so daß $\bigcup_{i=0}^{\infty} I_n =]0, 1[$ offen ist.
Hinweis: Die Beispiele zeigen, daß Durchschnitte beliebig vieler offener Mengen nicht offen und Vereinigungen beliebig vieler abgeschlossener Mengen nicht abgeschlossen sein müssen.

Aufgabe 3. Bestimmen Sie zu $\epsilon = \frac{1}{2019}$ ein $\delta > 0$ (mit Begründung!), so daß

- (a) $\left| \frac{1}{x^2 - 3x + 3} - 1 \right| < \epsilon$ für alle $x \in \mathbb{R}$ mit $|x - 2| < \delta$
- (b) $f(K_\delta((0, 0))) \subseteq K_\epsilon(f((0, 0)))$ für $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben durch
$$f((x, y)) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2+y^2} & \text{für } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Aufgabe 4. (4 Zusatzpunkte) Zeichnen Sie einen Nikolaus unter ausschließlicher Verwendung von Ziffern, griechischen Buchstaben und mathematischen Symbolen.